



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ελληνική
Ψυχιατρική Εταιρεία
Κλάδος Κλινικής
Ψυχοφαρμακολογίας

9^ο Ψυχοφαρμακολογικό
Συνέδριο
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

2-4 Δεκεμβρίου 2022
Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos **ΑΘΗΝΑ**

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΗΙΥ

Σίδερη Σ., Καρυτινού Μ.

Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα μελέτη είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αντικαταθλιπτικής θεραπείας σε άτομα τα οποία νοσούν από HIV.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο HIV (Human Immunodeficiency Virus) είναι ρετροϊός ο οποίος προσβάλλει κύτταρα του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος με αποτέλεσμα την προοδευτική εξασθένιση αυτού οδηγώντας σε ανοσοανεπάρκεια.

Η Μείζονα Κατάθλιψη (ΜΚ) είναι μια από τις πιο συχνές συνυπαρχουσες διαταραχές σε άτομα τα οποία νοσούν από τον ιό HIV.

Ο θεμέλιος άξονας της θεραπείας της ΜΚ σε ασθενείς με HIV είναι η φαρμακοθεραπεία.

Επιπλέον, φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του HIV ενδέχεται να προκαλέσουν νευροψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής διαταραχής.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ


Χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων Pubmed/Medline, Medscape, Cochrane και Scopus. Η αναζήτησή έγινε τον 11/2022.

Αναζητήθηκαν άρθρα βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Εξετάστηκαν όλες οι διαθέσιμες πηγές. Οι όροι αναζήτησης ήταν “depression HIV”, “antidepressants HIV”, “depression human immunodeficiency virus” ”.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Η αντικαταθλιπτική θεραπεία, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη βελτίωση της κατάθλιψης κατά την αξιολόγηση με την κλίμακα Hamilton (HAM-D).
- Η πλειοψηφία των μελετών δεν αναδεικνύει σημαντική διαφορά στην αποτελεσματικότητα ανάμεσα στις κατηγορίες των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και έτσι η σημαντικότερη συνιστώσα της θεραπείας φάνηκε να είναι η συμμόρφωση των ασθενών, η οποία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.
- Σε άτομα τα οποία λάμβαναν SSRIs αναφέρθηκε συχνά ως ανεπιθύμητη ενέργεια η σεξουαλική δυσλειτουργία ενώ σε εκείνα στα οποία χορηγούνταν Τρικυκλικά Αντικαταθλιπτικά (TCA) αναφέρθηκαν συχνά αντιχολινεργικές ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ.ξηροστομία, δυσκοιλιότητα).

(neuro)inflammation



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Η αντικαταθλιπτική θεραπεία φαίνεται να είναι η πλέον αποτελεσματική θεραπεία της ΜΚ σε άτομα με λοίμωξη από τον ιό HIV βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και μειώνοντας σημαντικά τη θνησιμότητα.