

Η ΛΟΥΡΑΣΙΔΟΝΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΩΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ.

Χ. Ιστίκογλου¹, Ε. Ανδρέου¹, Ν. Παναγιωτόπουλος¹,
Ν. Λαμπράκη¹, Ι. Ριζάβας², Γ. Μαυρίδης¹, Δ. Μούσδη¹,
Δ. Αβραμίδης¹, Δ. Κεντρωτή¹.

¹Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ. Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων.

²Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ), Δαφνί.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λουρασιδόνη είναι ένα νέο άτυπο αντιψυχωσικό που δρα ως αποκλειστής υποδοχέων ντοπαμίνης (D) και ως αναστολέας επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (5HT).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρήση της στη θεραπεία της Ψυχωσικής Κατάθλιψης.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Μελετήθηκαν 20 ασθενείς (n=20), εκ των οποίων 15 γυναίκες (n=15) και 5 άνδρες (n=5), οι οποίοι νοσηλεύθηκαν τη διετία 2022-2023 στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων με διάγνωση Ψυχωσική Κατάθλιψη και έλαβαν θεραπεία με λουρασιδόνη 75mg και προσθήκη αγχολυτικού και αντικαταθλιπτικού φαρμάκου. Σε όλους χορηγήθηκε η Κλίμακα Hamilton (HAM-D) την ημέρα της εισαγωγής και την 45^η ημέρα της θεραπείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι 15 ασθενείς (n=15), εκ των οποίων 12 γυναίκες (n=12) και 3 άνδρες (n=3), την 45^η ημέρα θεραπείας με 75mg λουρασιδόνης, παρουσίασαν σαφή μείωση της Κλίμακας Hamilton (HAM-D), με score κάτω του 8, και ποσοστό ανταπόκρισης 66%. Οι υπόλοιποι που δεν ανταποκρίθηκαν στην αγωγή, παραπέμφθηκαν για συνοδό θεραπεία με ECT.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η λουρασιδόνη είναι ένα νέο άτυπο αντιψυχωσικό που τίθεται στην θεραπευτική φάρετρα αντιμετώπισης της ψυχωσικής κατάθλιψης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. *Leucht S, Cipriani A, Spineli L, Mavridis D, Orey D, Richter F et al. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet 2013; 382(9896):951-62.*
 2. *McEvoy JP, Citrome L, Hernandez D, Cucchiaro J, Hsu J, Pikalov A, Loebel A. Effectiveness of lurasidone in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder switched from other antipsychotics: a randomized, 6-week, open-label study. J Clin Psychiatry 2013; 74(2):170-9.*
-